

# SF1624 Algebra och geometri

## Föreläsning 14

Lars Filipsson

Institutionen för matematik  
KTH

30 november 2016

## Determinanter forts, kap 5

- 1 Mer om determinanter
- 2 Alternativa beräkningsmetoder
- 3 Teori och tillämpningar

## Egenskaper hos determinanter av $n \times n$ -matriser

Om  $A$  är en  $n \times n$ -matris så gäller att

1.  $\det A$  anger avbildningsskala
2.  $\det A \neq 0$  är ekvivalent med att
  - (i)  $A\vec{x} = \vec{b}$  har unik lösning för varje högerled
  - (ii)  $A\vec{x} = \vec{0}$  har bara den triviala lösningen
  - (iii)  $A$  har invers
  - (iv)  $A$  har full rang.

För alla  $n \times n$ -matriser gäller att

$$\det AB = \det A \det B$$

och om  $A$  är inverterbar är  $(\det A)(\det A^{-1}) = 1$

## Determinanter av $2 \times 2$ -matriser

Om  $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$  så definieras determinanten av  $A$  genom

$$\det A = ad - bc$$

## Determinanter av $n \times n$ -matriser

För  $n \geq 3$ , om  $A$  är en  $n \times n$ -matris, låt  $A(i, j)$  beteckna den  $(n - 1) \times (n - 1)$ -matris man får från  $A$  genom att stryka rad  $i$  och kolonn  $j$  i  $A$ .

Med beteckningar som ovan låt vidare kofaktorn  $C_{ij}$  till  $A$  definieras genom

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A(i, j)$$

Nu definierar vi determinanten av  $A$  genom

$$\det A = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \cdots + a_{1n}C_{1n}$$

## Determinanter av $n \times n$ -matriser

**Sats.** Determinanten fås även genom utveckling längs vilken annan rad som helst, eller längs vilken kolonn som helst.

**Följdsats.** Om någon rad eller kolonn i matrisen  $A$  består av bara 0:or, så är  $\det A = 0$

**Följdsats.** Om matrisen  $A$  är triangulär så är  $\det A =$  produkten av diagonalelementen.

**Följdsats.**  $\det A^T = \det A$

## Determinanter och radoperationer.

Om  $A$  är triangulär så är  $\det A =$  produkten av diagonalelementen.

**Fråga:** Kan man förenkla uträkningen av determinanten genom att Gaussa? Hur förändrar radoperationer determinanten?

**Svar:**

- 1 Att multiplicera en rad med ett tal  $r$  förändrar determinanten med en faktor  $r$
- 2 Att byta plats på två rader gör att determinanten byter tecken
- 3 Att lägga en multipel av en rad till en annan rad förändrar inte determinanten

## Uppgift:

1. Beräkna  $\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$  genom att använda radoperationer för att få matrisen triangulär. (Obs detta är inte det smartaste sättet för just denna matris)

2. Beräkna  $\det \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \\ 3 & 14 & 10 \end{bmatrix}$  genom att använda radoperationer för att få matrisen triangulär.

Facit: 15, 44



**Beräkna dessa determinanter genom inspektion:**

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 9 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} =$$

$$\det \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 3 & 14 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 4 & 17 \\ 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 91 \end{bmatrix} =$$

## Alternativ definition av determinanten

Om  $A = (a_{ij})_{n \times n}$  så är

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma_1} a_{2\sigma_2} \cdots a_{n\sigma_n}$$

där  $S_n$  är mängden av permutationer av  $n$  objekt och  $\sigma_j$  är objektet på plats  $j$  i permutationen  $\sigma$ .

## Sarrus regel för $3 \times 3$ -determinanter:

Se wikipedia

## Kofaktormatriser

Minns att kofaktorn  $C_{ij}$  till  $n \times n$ -matrisen  $A$  definieras genom

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A(i, j)$$

där  $A(i, j)$  betecknar den  $(n-1) \times (n-1)$ -matris man får från  $A$  genom att stryka rad  $i$  och kolonn  $j$  i  $A$ .

Kofaktormatrisen  $\text{cof}A$  till  $A$  är nu den  $n \times n$ -matris vars element är kofaktorerna till  $A$ , dvs den matris som på rad  $i$  kolonn  $j$  har talet  $C_{ij}$ .

**Exempel:** Beräkna  $\text{cof}A$  om  $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 6 & -2 & 5 \end{bmatrix}$

## Kofaktormatriser

Detta ger oss ett nytt sätt att beräkna inversen till en  $n \times n$ -matris (om den finns):

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} (\text{cof} A)^T$$

Obs. För  $2 \times 2$ -matriser betyder detta:

$$\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$$

## Cramers regel

Detta är ytterligare ett sätt att lösa kvadratiska linjära ekvationssystem där koefficientmatrisen är inverterbar.

Låt  $A$  vara en  $n \times n$ -matris som är inverterbar. Då har  $A\vec{x} = \vec{b}$  lösningen

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} \det N_1 \\ \det N_2 \\ \vdots \\ \det N_n \end{bmatrix}$$

där  $N_i$  är matrisen  $A$  med kolonn  $i$  utbytt mot högerledet  $\vec{b}$ .

Lös med Cramers regel (eller med någon annan metod)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

och

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Facit:

$$\begin{bmatrix} -5 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

## Uppgifter

1. Låt  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 19 & 5 & 0 \\ 11 & 2 & 7 & 1 \end{bmatrix}$ . Bestäm rangen av  $A$ . Är  $A$  inverterbar?

2. Låt  $A = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 7 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ . Beräkna volymen av bilden av enhetsklotet  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$  under den linjära avbildning som ges av  $A$ .

## Uppgifter forts.

3. Är kolonnerna i matrisen  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$  linjärt oberoende?