

# LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN 1

## SF1664

Tillämpad envariabelanalys med numeriska metoder  
för CFATE1 den 9 januari 2014 kl 08.00-13.00

### Uppgifterna 1-3 svarar mot KS 1

1. Bestäm alla reella tal  $v$  som uppfyller ekvationen  $\sin v \cos v = 0$ .

LÖSNING: Ekvationen uppfylls om och endast om  $\sin v = 0$  eller  $\cos v = 0$ , dvs om och endast om  $v = n\pi$  eller  $v = \pi/2 + n\pi$  för något heltal  $n$ . Detta kan sammanfattas med att  $v = n\pi/2$  för något heltal  $n$ .

Svar:  $v = n\pi/2$  för något heltal  $n$

2. Låt  $p(x) = x^3 - 21x + 20$ . Då gäller att  $p(1) = 0$ , dvs  $x = 1$  är ett nollställe till polynomet. Uppgift: Faktorisera polynomet i förstgradsfaktorer, dvs skriv  $p(x)$  som en produkt av förstgradspolynom.

LÖSNING: Vi utför polynomdivision och får att  $x^3 - 21x + 20 = (x - 1)(x^2 + x - 20)$ . Vi fortsätter genom att faktorisera andragsgradsfaktorn i högerledet. Med hjälp av pq-formeln får vi att

$$x^2 + x - 20 = 0 \iff x = 4 \text{ eller } x = -5.$$

Enligt faktorsatsen får vi nu att  $x^2 + x - 20 = (x - 4)(x + 5)$  och alltså

$$x^3 - 21x + 20 = (x - 1)(x - 4)(x + 5),$$

vilket är den sökta faktoriseringen.

Svar:  $x^3 - 21x + 20 = (x - 1)(x - 4)(x + 5)$

3. a. Beräkna gränsvärdet

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$$

b. Bestäm konstanten  $k$  så att funktionen

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x} & \text{när } x \neq 0 \\ k & \text{när } x = 0 \end{cases}$$

blir kontinuerlig för alla  $x$ .

LÖSNING: a. Med hjälp av ett standardgränsvärde får vi att

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{\sin 2x}{2x} = 2.$$

b. För  $x \neq 0$  är  $f(x)$  givet av ett elementärt uttryck och därför är  $f$  kontinuerlig för alla  $x \neq 0$ , oberoende av hur  $k$  väljs. Vi undersöker kontinuiteten i  $x = 0$ . För att  $f$  ska vara kontinuerlig här krävs att  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ . Enligt uppgift a är  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$  och enligt definitionen av  $f$  är  $f(0) = k$ . För kontinuitet i origo är det alltså nödvändigt och tillräckligt att  $k = 2$ .

Svar: a. 2. b. 2.

## Uppgifterna 4-6 svarar mot KS 2

4. Derivera nedanstående funktioner med avseende på variabeln  $x$  (endast svar krävs).

a.  $f(x) = 2^x$

b.  $g(x) = e^{2x} \cos 3x$

c.  $h(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$

a.  $k(x) = \ln \sqrt{1 + x^2}$

Svar: a.  $2^x \ln 2$ . b.  $2e^{2x} \cos 3x - 3e^{2x} \sin 3x$ . c.  $\frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$ . d.  $\frac{x}{1 + x^2}$

5. a. Visa att ekvationen  $x^3 + 3x - 1 = 0$  har exakt en reell lösning.

b. Låt  $x_0 = 0$  och gör en iteration av Newton-Raphsons metod för att erhålla en approximation av lösningen.

c. Avgör om din approximation är större eller mindre än lösningen.

LÖSNING: a. Sätt  $f(x) = x^3 + 3x - 1$ . Då är ekvationen i uppgiften ekvivalent med att  $f(x) = 0$ . Vi deriverar och får  $f'(x) = 3x^2 + 3$  som existerar och är positivt för alla  $x$ . Det följer att  $f$  är strängt växande och  $f(x) = 0$  har därför högst en lösning. Eftersom  $f(0) = -1$  och  $f(1) = 3$  så följer av satsen om mellanliggande värden ( $f$  är ju kontinuerlig) att  $f(x) = 0$  har en lösning mellan 0 och 1.

b. Eftersom  $f(0) = -1$  och  $f'(0) = 3$  får vi med Newton-Raphsons metod att

$$x_1 = 0 - \frac{-1}{3} = \frac{1}{3},$$

som är vår approximation av lösningen.

c. Eftersom  $f''(x) = 6x$  som är positiv i det aktuella intervallet så är  $f$  konvex och vår approximation måste vara större än den korrekta lösningen. (Man kan också resonera så att eftersom det finns exakt en lösning och  $f(0) < 0$  medn  $f(1/3) > 0$  så måste lösningen ligga mellan 0 och  $1/3$  vilket gör att vår approximation är större än den verkliga lösningen.)

Svar: a. Se lösningen. b.  $1/3$ . c. Större.

6. Antar funktionen  $f(x) = x^3e^{-x}$  ett största och ett minsta värde? Finn största respektive minsta värdet om de finns och förklara annars varför de inte finns.

LÖSNING: Eftersom  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  så kan ett minsta värde inte finnas. För att undersöka ett eventuellt största värde gör vi teckenschema för derivatan, hittar ev extrempunkter och skissar kurvan  $y = f(x)$ . Vi observerar att definitionsmängden för  $f$  är alla reella tal. Vi deriverar och får  $f'(x) = 3x^2e^{-x} - x^3e^{-x} = x^2e^{-x}(3 - x)$  som existerar för alla  $x$  och är 0 om och endast om  $x = 0$  eller  $x = 3$ . Teckenstudium:

Om  $x < 0$  så är  $f'(x) > 0$  och  $f$  är strängt växande.

Om  $0 < x < 3$  så är  $f'(x) > 0$  och  $f$  är strängt växande.

Om  $3 < x$  så är  $f'(x) < 0$  och  $f$  är strängt avtagande.

Vi ser att  $f$  har en terrasspunkt i origo och ett lokalt och globalt max i  $x = 3$ . Vi observerar att  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ .

Slutsatsen av ovanstående är att  $f$  har ett största värde som antas i  $x = 3$ . Det största värdet är  $f(3) = 27/e^3$ .

Svar: Största värdet är  $27/e^3$  och minsta värde saknas.

### Uppgifterna 7-9 svarar mot KS 3

7. a. Beräkna med hjälp av partiell integration  $\int_1^e x \ln x \, dx$ .

b. Använd substitutionen  $u = \sin x$  för att beräkna  $\int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x \, dx$ .

LÖSNING: a. Vi använder partiell integration och får

$$\int_1^e x \ln x \, dx = [(x^2/2) \ln x]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

b. Vi använder substitutionen  $u = \sin x$ , med  $\cos x \, dx = du$  och nya gränser 0 resp 1, och får

$$\int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x \, dx = \int_0^1 e^u \, du = e - 1.$$

Svar: a.  $\frac{e^2+1}{4}$ . b.  $e - 1$

8. a. Använd trapetsregeln och steglängd 1/2 för att approximativt beräkna

$$\int_2^3 \frac{1}{x-1} \, dx$$

b. Avgör om ditt approximativa värde är större eller mindre än det verkliga värdet.

LÖSNING: a. Med trapetsregeln och steglängden 1/2 får vi

$$\int_2^3 \frac{1}{x-1} \, dx \approx \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \right) = \frac{17}{24}.$$

b. Eftersom kurvan är konkav får vi att det approximativa värdet är större än det verkliga värdet.

Svar: a. 17/24. b. Större.

9. Beräkna integralen  $\int_1^2 x\sqrt{x-1} \, dx$ .

LÖSNING: Man kan använda partiell integration eller variabelsubstitution om man vill. Här används bara elementära omskrivningar:

$$\int_1^2 x\sqrt{x-1} dx = \int_0^1 ((x-1)\sqrt{x-1} + \sqrt{x-1}) dx = \left[ \frac{(x-1)^{5/2}}{5/2} + \frac{(x-1)^{3/2}}{3/2} \right]_1^2 = \frac{16}{15}$$